

Epidurális érzéstelenítés a szülés során

Tájékoztató az epidurális katéter behelyezéséről

➤ **SÜRGŐSSÉGI SZÁM**

065 199 6903

24 órában elérhető sürgős segítségért

Az epidurális katéter behelyezése

Először infúzióval extra folyadékot kapsz. Ez azért szükséges, hogy a vérnyomásod túlzottan ne csökkenjen.

Az eljárás során:

- Előrehajolva ülsz, vagy néha az oldaladra fekszel
- Domborítanod kell a gerincedet
- Nem szabad mozognod
- Figyelmeztetned kell az aneszteziológust, ha összehúzódásokat érzel
- A bőrt megtisztítják, fertőtlenítik a szúrás helyén, és helyben érzéstelenítik

Időtartam:

- Az epidurális katéter behelyezése általában 15 percet vesz igénybe
- További 5-15 perc a hatóanyag érvényre jutásáig
- Miután a katétert behelyezték és rögzítették, újra mozoghatsz
- A katétert egy pumpához csatlakoztatják, amely folyamatos vagy adagolt fájdalomcsillapítást biztosít

Az epidurális érzéstelenítés hatásai

- A fájdalom jelentősen csökken vagy teljesen megszűnik
- Érzéketlenség az alsó testfelső részén
- Lehetséges vérnyomáscsökkenés - ezért kapsz infúziót
- Nehezebb lehet a préselési inger érzékelése a kitolási szakaszban
- Esetleges fejfájás a szúrást követően (ritka)

Mikor kérhető?

Az epidurális érzéstelenítés kizárólag **kórházban** alkalmazható, aneszteziológus közreműködésével. Ha otthon vagy szülésközpontban szülsz, ez a lehetőség nem áll rendelkezésre.

⚠ **Vízben történő szülésnél epidurális érzéstelenítés nem alkalmazható.**

Kérdéseid vannak?

Minden kérdéset felteheted a szülésznőnek vagy az aneszteziológusnak. Nincs „felesleges” kérdés!

Sürgősségi szám: 065 199 6903 | Weipoort 1, 3075 EW Rotterdam | www.rotterdambevalt.nl |
www.magyaraszuleszno.nl
„Egy nyugodt terhesség és sikeres szülés - ezért dolgozunk!” - Eva Szabados & Roselie van den Berg